







as miñas, nosas, aves acuáticas e dos humidaís



Aves con adaptacións específicas para poderen desenvolver a súa vida en medios acuáticos ou moi húmidos.



Unhas teñen patas longas para poderen moverse en espazos asolagados sen mollar as plumas



Outras contan con pés palmeados, para mellorar a súa capacidade de desprazamento pola auga



E moitas teñen plumaxes impermeables, que impiden a penetración da auga e permiten manter a temperatura corporal,






Mergullón grande

(*Podiceps cristatus*).

Mide de 46 a 51 cm. Vese en masas de auga calma con vexetación arredor. Cría en varios encoros e lagoas. No inverno aumenta a súa presenza con exemplares europeos.






Mergullón pequeño

(Tachybaptus ruficollis).

Mide de 25 a 30 cm. Atópase en zonas de augas abertas, calmas e con vexetación arredor.







Paíño europeo

(*Hydrobates pelagicus*).

Mide de 15 a 17 cm. Vive no mar aberto, mais achégase á costa se hai mal tempo.




As aves de mar aberto case so se ven de preto cando chegan mortas á costa



Pardela cincenta

(Calonectris diomedea).

Mide de 45 a 55 cm. Atópase no mar aberto. É habitual vela nos pasos.



Mascato

(*Morus bassanus* antes *Sula bassana*).

Mide de 86 a 98 cm. Vive en mar aberto, pero pode verse, ao lonxe, desde a costa.





Corvo mariño real

(*Phalacrocorax carbo*).

Mide de 77 a 95 cm. Atópase, desde mediados do verán até a primavera seguinte, tanto na costa como en ríos e encoros.








Corvo mariño cristado


(*Phalacrocorax aristotelis*).


Mide de 65 a 79 cm. En Galiza vese por toda a costa. So loce a crista durante a época de cría.






Garza real (*Ardea cinerea*).
Mide de 84 a 102 cm. Vese
case todo o ano, en maior
número de outono a
primavera, en esteiros,
marismas, lagoas e ríos.






Garzota (*Egretta garzetta*).

Mide de 55 a 65 cm. Vese desde mediados do verán até comezos da primavera, en esteiros, lagoas e encoros.






Garza branca (*Egretta alba*).


Mide de 85 a 102 cm. Vese en esteiros e lagoas e zonas da costa protexidas en augas pouco profundas.





Garza mediana (*Bubulcus ibis*).
Mide 45 a 55 cm. Vese no inverno
en zonas húmidas e espazos
abertos con cultivos ou gando.






Garza denoiteira

(*Nycticorax nycticorax*).

Mide de 58 a 65 cm. Vese nos pasos ou no verán, e moi escasamente, á beira de ríos ou lagoas con vexetación abundante nas ribeiras.


Na imaxe grande un xuvenil á beira dun río.





Cullereiro (*Platalea leucorodia*).
Mide 80 a 90 cm. Cada volta máis
común, como invernante, en lagoas e
esteiros.






Cegoña branca (*Ciconia ciconia*).


Mide de 95 a 112 cm. Atópase en zonas húmidas e cultivos. En Galiza atópase da primavera ao outono e xa hai algunhas que pasan aquí o inverno.





Ciño real (*Cygnus olor*).
Mide de 140 a 160 cm. Vese como
invernante ocasional en rías
esteiros, encoros e lagoas.








Ganso de cabeça negra


(*Branta bernicla*).


Mide de 55 a 61 cm. Vese, como
invernante escaso, en zonas á beira
do mar.





Lavanco (*Anas platyrhynchos*).
Mide entre 50 e 60 cm. Atópase
en calquera masa de auga tanto
do litoral como do interior e ao
longo dos ríos en zonas de
corrente escasa.





Pato asubiión (*Anas penelope*).
Mide de 42 a 50 cm. Vese de
setembro a abril nas rías e nos
esteiros.




Parella de asubiións. Diante a
femia e detrás o macho



Pato cullerete (*Anas clypeata*).
Mide de 45 a 52 cm. Vese como
invernante en esteiros e lagoas.






Pato rabilongo (*Anas acuta*).
Mide de 50 a 65 cm. Vese como
invernante, pouco común, en
esteiros e lagoas.





Pato cincento (*Anas strepera*).
Mide de 48 a 56 cm. Vese como
invernante, pouco común, en
esteiros, lagoas e encoros.





Pato rubio (*Netta rufina*).
Mide 53 a 57 cm. Vese como
invernante, moi escaso, en
esteiros, lagoas e encoros.



Na imaxe, unha femia



Parrulo chupón (*Aythya ferina*).
Mide de 42 a 49 cm. Vese como
invernante en esteiros, encoros e
lagoas





Parrulo cristado común

(*Aythya fuligula*).

Mide de 40 a 47 cm. Vese
como invernante en esteiros,
lagoas e encoros.






Cerceta real (*Anas crecca*).

Mide de 34 a 45 cm. Vese como
invernante en esteiros, lagoas e
encoros.






Rascón (*Rallus aquaticus*).
Mide de 23 a 26 cm. Atópase en
marismas, ribeiras fluviais, e lagoas
con vexetación mesta.




Femia cuns polos



Galiñola, galiña de río
(*Gallinula chloropus*).
Mide de 32 a 35 cm.
Atópase en lagoas e beiras
de ríos con vexetación
mesta.




Na imaxe grande dous adultos e
na pequena un xuvenil.




Galiñola negra (*Fulica atra*).
Mide de 36 a 42 cm. Atópase en
lagoas e encoros con augas abertas
e vexetación mesta nas beiras.





Gabita (*Haematopus ostralegus*).
Mide de 39 a 45 cm. Vese como
invernante, en praias, esteiros e
coídos




Patuda

(Himantopus himantopus).

Mide de 33 a 38 cm. So se ve, escasa, no verán e nos pasos, en marismas, esteiros e lagoas.





Píllara papuda

(*Charadrius alexandrinus*).

Mide de 15 a 17 cm. Vese nos pasos e tamén como aniñante, escaso, en praias e dunas.




Unha femia chocando, nun recinto protexido, nunha praia.



Píllara real

(*Charadrius hiaticula*).
Mide de 15 a 18 cm. Vese,
como invernante e nos
pasos, en praias e esteiros.






Nos debuxos imaxes de machos das dúas razas (albifrons, á dereita, e apricaria, á esquerda) durante o verán.



Píllara dourada europea (*Pluvialis apricaria*).
Mide de 25 a 29 cm. É invernante común en praderías, brañas, areais e marismas.




Durante o inverno machos e femias, de calquera das dúas razas, teñen un aspecto moi semellante




Avefría (*Vanellus vanellus*).
Mide de 28 a 30 cm. Vese como
invernante común, en praderías,
brañas e esteiros. Cría nalgúns lugares.





Pilro bule-bule,
arriba no inverno e
abaixo no verán.

Pilro bule-bule (*Calidris alba*).
Mide de 18 a 20 cm. Vese, en
abundancia, nos pasos en praias e
nos espazos intermareais.







Pilro curlibico,
arriba no inverno e
abaixo no verán.

Pilro curlibico (*Calidris alpina*).
Mide entre 18 e 21 cm. É común
e abundante, como invernante e
durante os pasos, en areais,
marismas e en zonas húmidas
do interior.



Becacina (*Gallinago gallinago*).
Mide de 24 a 28 cm. Vese como
invernante, pouco común, en marismas,
prados asolagados e brañas





Arcea (*Scolopax rusticola*).

mide de 33 a 38 cm.

É invernante, pouco común, en bosques de folla caediza con algo de mato, viñas e, ocasionalmente, en marismas.




Mazarico rabinegro

(*Limosa limosa*).

Mide de 37 a 42 cm. É común como invernante en esteiros, marismas e áreas lamacentas.






Mazarico rabipinto
(*Limosa lapponica*).
Mide de 33 a 41 cm.
É común como
invernante en esteiros e
areais.



Mazaricos rabipintos con prumaxe de verán a finais da primavera





Mazarico chiador (*Numenius phaeopus*).
Mide de 35 a 45 cm. É invernante pouco
común, mais tamén se ve nos pasos, en
praias marismas e coídos e zonas húmidas
do interior.






Mazarico curli (*Numenius arquata*).
Mide de 50 a 57 cm. É invernante, mais
tamén se ve nos pasos, en marismas
esteiros, praias e zonas húmidas do
interior.





Bilurico común (*Tringa totanus*).
Mide de 24 a 28 cm. É invernante
común en marismas lamacentas e
esteiros, mais tamén se pode ver no
verán en prados húmidos do interior
preto de ríos ou lagoas.






Bilurico pativerde

(*Tringa nebularia*).

Mide de 30 a 34 cm. Vese, como
invernante pouco común, en
marismas e areasis.





Bilurico bailón (*Actitis hypoleucos*).
Mide de 18 a 21 cm. É invernante,
bastante común, na beira de ríos e
encoros, e en praias rochas e
coídos da costa.






Píllara riscada

(*Arenaria interpres*).

Mide de 21 a 24 cm. É invernante común, e tamén se ve nos pasos, en case toda a costa, maiormente nas rochas e nos areasis.



Arriba, aspecto no verán,
e á esquerda, no inverno.




Gaivota chorona (*Larus ridibundus*).
Mide de 34 a 39 cm. É invernante
moi común na beira do mar e en
lagoas e encoros do interior.




Arriba con plumaxe de
inverno e, á dereita con
plumaxe de verán






Gaivota patiamarela (*Larus cachinnans*).

Mide de 56 a 58 cm. É sedentaria e abundante en toda a costa, e visitante asidua de vertedoiros do interior.




Gaivota escura (*Larus fuscus*).
Mide de 48 a 56 cm. É común como
invernante en toda a beira do mar.
Cría nalgunhas zonas.






Gaivota arxentea (*Larus argentatus*).
Mide de 55 a 65 cm. É invernante
escasa en costas rochosas, esteiros e
outros espazos litorais.





Gaivotón (*Larus marinus*).
Mide de 62 a 68 cm. É
invernante común, mais non
numeroso, ao longo de toda a
beira do mar.







Gaivota tridáctila

(*Rissa tridactyla*).

Mide de 37 a 42 cm. É invernante mar afora con un so punto de cría coñecido.



Imaxe da colonia das illas Sisargas (2009).




Carrán mascateiro

(Gelocheidon nilotica).

Moi raro, so se ve ocasionalmente nos pasos, en marismas, esteiros e masas de auga do interior.






Carrán cristado

(*Thalasseus sandvicensis*).

Mide de 37 a 43 cm. É común como invernante, mais ten presenza ao longo de todo o ano, no litoral.






Arao dos cons (*Uria aalge*).


Mide de 38 a 46 cm. Vive mar afora e so se pode ver en puntos da costa na época de cría.






Arao romeiro (*Alca torda*).
Mide de 38 a 45 cm. É invernante regular, mais difícil de ver porque vive mar afora.






Arao papagaio (*Fracarcula arctica*).
Mide de 28 a 34 cm. É invernante regular, mais escaso e difícil de ver porque se atopa sempre mar afora.





Picapeixe (*Alcedo atthis*).
Mide de 17 a 20 cm. Pouco
común, vese na beira de
masas de auga desde ríos e
regatos ao mar.





Montaxe e debuxos: Mon Daporta
Fotos Mon Daporta e Adela Leiro
Agosto 2026